

INFORMATION OM ØJENPROVOKATION

(konjunktival provokation)



Børne- og Allergiklinikken
Slagelse
Tlf. 58 53 11 03

Hvorfor øjenprovokation?

Øjenprovokation foretages for at måle graden af følsomhed i øjne og næse overfor et bestemt allergen (dét stof man er overfølsom overfor).

Undersøgelsens resultat har betydning for diagnose og evt. behandlingstilbud.

Hvordan foregår øjenprovokation?

Allergen-ekstrakt i forskellige fortyndinger dryppes i øjnene 4 gange med mindst 10 minutters interval.

Efter drypning kan der komme reaktion, der svarer til en allergisk betinget irritation som kløe, rødme, hævelse, tåreflåd, nysen, stoppet eller løbende næse svarende til de symptomer, du plejer at få ved kontakt med allergenet.

Hvis undersøgelsen viser et positivt resultat, standses undersøgelsen, og der gives anti-allergiske øjendråber.

Selve undersøgelsen tager ca. 1 time.

Vær opmærksom på:

*Følgende medicin må **IKKE** tages de sidste 3 døgn før øjenprovokationen:*

- Leukotrien, ”Singular”.
- Antihistamin (f.eks. Aerius, Telfast, Alnok).
- Øjendråber (f.eks. Opatanol, Livostin, Antistina-Privin, Lomodol, Tilavist).
- Næsespray (f.eks. Iliadin, Otrivin, Livostin, Lomodol).

*Følgende medicin må **IKKE** tages de sidste 14 døgn før øjenprovokationen:*

- Næsespray med steroid (f.eks. Avamys, Nasonex, Rhinocort, Flixonase, Beconase).

Ovenstående medicin må benyttes igen, når undersøgelsen er helt afsluttet.

Hvis du har øjeninfektion eller er forkølet, skal øjenprovokationen udsættes, til du er rask igen. Du kan ikke bære kontaktlinser i forbindelse med undersøgelsen. Undgå brug af øjen make-up før undersøgelsen.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på tlf. 58 53 11 03.

Mvh.

Morten Gervil
Speciallæge

Gitte Lang
Sygeplejerske