

Penicillin/medicin- provokation



**Børne- og Allergiklinikken
Slagelse
Tlf. 58 53 11 03**

Dit barn skal have foretaget en undersøgelse for penicillin-/medicinallergi.

Vigtigt!

Barnet må ikke have fået antihistaminer, (Xyzal, Aeries, Cetirizin el. lign.) 3 dage før undersøgelsen, da dette kan ændre resultatet.

Barnet skal være rask og må ikke have udslæt den dag, undersøgelsen foretages. Ved tvivl ring til os.

Selve provokationen.

Barnet vil blive undersøgt af sygeplejersken og evt. få målt lungefunktion, puls og blodtryk.

Provokationen foregår ved, at barnet starter med at drikke en lille dosis penicillin/medicin, og hvis dette tåles, øges mængden med 30 minutters mellemrum, til barnet har indtaget en normal dosis penicillin/medicin.

Herefter observeres barnet i yderligere 2 timer for reaktioner på penicillin/medicinen.

Hele testen varer cirka 4 timer.

Barnet må ikke forlade klinikken under testen.

Hvis der kommer reaktioner på provokationen, vil vi afbryde testen og behandle symptomerne.

Det er en god idé at medbringe læsestof eller anden underholdning.

Medbring evt. madpakke, drikkevarer og evt. barnevogn.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på:

Tlf. 58 53 11 03

Der er aftalt tid til penicillin-/medicin provokation d.:
